

Kloka Kliniska Val – Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi

- Uppföljning för kolorektalcancer bör ske enligt gällande vårdprogram. För patienter vars allmäntillstånd inte medger ytterligare behandling kan uppföljning avstås.

[Nationellt vårdprogram tjock- och ändtarmscancer.- .Kunskapsbanken](#)

- Okomplicerad divertikulit hos immunokompetent individ ska inte behandlas med antibiotika och kan hanteras polikliniskt, förutsatt att patienten har kan försörja sig per os och är adekvat smärtlindrad med perorala läkemedel.

[European.Society.of.Coloproctology;guidelines.for.the.management.of.diverticular.disease.of.the.colon._Schultz._8686._Colorectal.Disease._Wiley.Online.Library](#)
[Randomized.clinical.trial.of.antibiotics.in.acute.uncomplicated.diverticulitis._PubMed](#)

- Vid hemorrojder bör stolpiller eller salvor med steroider undvikas; istället rekommenderas bulkmedel för symptomlindring.

[Kunskapsstyrning hälsa och sjukvård.- .Proktologi](#)

- Enklare återbesök efter stomiuppläggning eller okomplicerad tarmresektion kan med fördel hanteras på annan vårdnivå exempelvis av stomi- eller kontaktsjuksköterska alternativt genom telefonuppföljning.

